

## Chapitre 8

# Primitives, intégrales

### Plan du chapitre

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Primitives</b>                                                              | <b>2</b>  |
| 1.1      | Primitive sur un intervalle                                                    | 2         |
| 1.2      | Primitive sur une partie de $\mathbb{R}$ quelconque                            | 3         |
| <b>2</b> | <b>Lien entre primitives et intégrale</b>                                      | <b>3</b>  |
| 2.1      | Définition de l'intégrale                                                      | 3         |
| 2.2      | Le théorème fondamental de l'analyse                                           | 4         |
| 2.3      | Un premier corollaire du TFA                                                   | 5         |
| 2.4      | Remarques sur le TFA et son premier corollaire                                 | 6         |
| 2.5      | Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$                                            | 6         |
| <b>3</b> | <b>Calcul pratique d'intégrales</b>                                            | <b>7</b>  |
| 3.1      | Reconnaitre une primitive                                                      | 7         |
| 3.2      | Propriétés de l'intégrale                                                      | 8         |
| 3.3      | Intégration par parties                                                        | 9         |
| 3.4      | Changement de variables $u = \varphi(x)$ dans $\int_a^b f(x)dx$                | 10        |
| 3.5      | Changement de variables $x = \varphi(t)$ dans $\int_a^b f(x)dx$                | 12        |
| 3.6      | Résultats de parité et de périodicité                                          | 13        |
| <b>4</b> | <b>Primitives et intégrales de fonctions complexes</b>                         | <b>14</b> |
| 4.1      | Définition                                                                     | 14        |
| 4.2      | Le passage par les complexes                                                   | 15        |
| <b>5</b> | <b>Intégrales de fonctions rationnelles</b>                                    | <b>16</b> |
| <b>6</b> | <b>Calcul de primitives par un calcul d'intégrale</b>                          | <b>18</b> |
| <b>7</b> | <b>Règles de Bioche – intégrales <math>\int_a^b R(\cos x, \sin x)dx</math></b> | <b>19</b> |
| <b>8</b> | <b>Méthodes pour les exercices</b>                                             | <b>20</b> |

#### Hypothèse

Dans tout ce chapitre,  $I$  et  $J$  désignent des intervalles de  $\mathbb{R}$  non triviaux (i.e. non vides et non réduits à un point).

De plus, la lettre  $\mathbb{K}$  désigne  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$  : dans chaque résultat, on peut ou bien remplacer tous les  $\mathbb{K}$  par  $\mathbb{R}$  ou bien remplacer tous les  $\mathbb{K}$  par  $\mathbb{C}$ .

# 1 Primitives

Voici tout d'abord un théorème préliminaire :

## Théorème 8.1

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{K}$  une fonction dérivable.  $f$  est constante sur  $I$  si et seulement si  $f' \equiv 0$  sur  $I$ .

*Démonstration.* On a vu le résultat (sans le démontrer) pour  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  au chapitre “Rappels et compléments sur les fonctions réelles”. Supposons  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ . Le sens direct est évident. Montrons le sens réciproque : on suppose donc que  $f'$  est nulle. On rappelle que  $f = \operatorname{Re} f + i \operatorname{Im} f$ , donc pour tout  $x \in I$ , on a

$$f'(x) = (\operatorname{Re} f)'(x) + i (\operatorname{Im} f)'(x) = 0$$

d'où, en égalisant partie réelle et partie imaginaire, on en déduit que (pour tout  $x \in I$ ), on a  $(\operatorname{Re} f)'(x) = 0$  et  $(\operatorname{Im} f)'(x) = 0$ . Ainsi,  $(\operatorname{Re} f)' \equiv 0$  et  $(\operatorname{Im} f)' \equiv 0$ . Comme  $\operatorname{Re} f$  et  $\operatorname{Im} f$  sont des fonctions à valeurs dans  $\mathbb{R}$ , on en déduit (par la version  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  de ce théorème), que  $\operatorname{Re} f$  et  $\operatorname{Im} f$  sont constantes. Ainsi,  $f = \operatorname{Re} f + i \operatorname{Im} f$  est également constante.  $\square$

**Remarque.** L'hypothèse “ $I$  est un intervalle” est essentielle. Si on définit  $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$  par :

$$f : x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

alors on montre facilement que  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}^*$  et que  $f' \equiv 0$  sur  $\mathbb{R}^*$ . Pourtant,  $f$  n'est pas constante sur  $\mathbb{R}^*$ . Cela est dû au fait que  $\mathbb{R}^*$  n'est pas un intervalle.

## 1.1 Primitive sur un intervalle

### Définition 8.2

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{K}$  une fonction. On appelle primitive de  $f$  (sur  $I$ ) toute fonction  $F : I \rightarrow \mathbb{K}$  dérivable sur  $I$  telle que  $F' = f$ .

Attention, il n'y a pas unicité de la primitive de  $f$  :

### Théorème 8.3

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{K}$  et  $F$  une primitive quelconque de  $f$  sur  $I$ .

1. Toute fonction  $G$  est une primitive de  $f$  sur  $I$  si et seulement si  $F - G$  est constante sur  $I$ .
2. En particulier, toutes les primitives de  $f$  sur  $I$  sont exactement les fonctions de la forme

$$x \mapsto F(x) + C \quad \text{avec } C \in \mathbb{K}$$

Une telle constante  $C$  est souvent appelée constante d'intégration.

*Démonstration.* Il suffit de montrer l'équivalence de la première assertion.

- Sens direct : on suppose que  $G$  est une primitive de  $f$  sur  $I$ . Montrons que  $F - G$  est constante sur  $I$ . La fonction  $F - G$  est dérivable comme différence de fonctions dérivables et :

$$(F - G)' = F' - G' = f - f \equiv 0$$

Alors, comme  $I$  est un **intervalle**, on en déduit que  $F - G$  est constante.

- Sens réciproque : on suppose que  $F - G$  est constante. Donc il existe  $K \in \mathbb{K}$  tel que pour tout  $x \in I$ ,  $(F - G)(x) = K$ . En particulier, on a  $G(x) = F(x) - K$ . Ainsi, la fonction  $G$  est dérivable sur  $I$  comme somme de fonctions dérivables, et

$$G'(x) = F'(x) + 0 = f(x)$$

La fonction  $G$  est donc bien une primitive de  $f$  sur  $I$ . □

**Exemple.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- Toutes les primitives de  $x \mapsto x^n$  sur  $I = \mathbb{R}$  sont les fonctions
- Toutes les primitives de  $x \mapsto x^{-1}$  sur  $I = \mathbb{R}_+^*$  sont les fonctions
- Toutes les primitives de  $x \mapsto x^{-1}$  sur  $I = \mathbb{R}_-^*$  sont les fonctions

## 1.2 Primitive sur une partie de $\mathbb{R}$ quelconque

Par extension, si  $D$  est une partie quelconque de  $\mathbb{R}$  (pas nécessairement un intervalle) et qu'on considère une fonction  $f : D \rightarrow \mathbb{K}$ , on appelle primitive de  $f$  (sur  $D$ ) toute fonction  $F : D \rightarrow \mathbb{K}$  dérivable telle que  $F' = f$ .



Si on cherche *toutes* les primitives de  $f$  sur un ensemble  $D$  qui n'est pas un intervalle, il faut rajouter une constante d'intégration a priori différente sur chaque intervalle compris dans  $D$ .

**Exemple.** On cherche toutes les primitives de la fonction  $f : x \mapsto \frac{1}{x}$  sur  $D = \mathbb{R}^*$ . Comme

$$D = \mathbb{R}^* = \underbrace{]-\infty, 0[}_{I_1} \cup \underbrace{]0, +\infty[}_{I_2}$$

les primitives de  $f$  sont toutes les fonctions  $F$  de la forme :

$$F(x) = \begin{cases} \ln(-x) + C_1 & \text{si } x < 0 \quad (\text{i.e. } x \in I_1) \\ \ln x + C_2 & \text{si } x > 0 \quad (\text{i.e. } x \in I_2) \end{cases} \quad \text{avec } C_1, C_2 \in \mathbb{K}$$

## 2 Lien entre primitives et intégrale

### 2.1 Définition de l'intégrale

On donne ici une définition informelle d'intégrale, pour une fonction continue :

#### Définition 8.4

Soit  $a, b \in I$  tels que  $a < b$ . Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue. On note

$$\int_a^b f(x) dx$$

l'aire (avec un signe) que fait la courbe  $\mathcal{C}_f$  avec l'axe des abscisses.

On verra en section 4 une définition de  $\int_a^b f(x)dx$  lorsque  $f$  est à valeurs dans  $\mathbb{C}$ . On admet que cette quantité est bien définie pour le moment.

**Exemple.** Soit  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$ . On a  $\int_a^b 0dx = \dots\dots\dots$  et  $\int_a^b 1dx = \dots\dots\dots$

**Remarque.** Toujours sous l'hypothèse  $a < b$ , on pose par convention :

$$\int_a^a f(t)dt = 0 \quad \int_b^a f(x)dx = - \int_a^b f(x)dx$$

On peut ainsi donner un sens à  $\int_a^b f(x)dx$  pour tous réels  $a$  et  $b$ , en distinguant les cas  $a < b$ ,  $a = b$  et  $a > b$ .

**Notation.** La variable selon laquelle on intègre, ici  $x$ , est **une variable muette** :

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(@)d@ = (\dots)$$

En particulier  $\int_a^b f(x)dx$  **ne dépend pas de  $x$** .

**Notation.** L'intégrale de  $f$  entre  $a$  et  $b$  se note aussi  $\int_a^b f$  : par définition,

$$\int_a^b f = \int_a^b f(x)dx$$

## 2.2 Le théorème fondamental de l'analyse

Le théorème qui suit est le résultat central du chapitre (ultérieur) de théorie de l'intégration. C'est dans ce chapitre ultérieur qu'on en fera la démonstration, ainsi que la construction précise de l'intégrale.

### Théorème 8.5 – Théorème Fondamental de l'Analyse (TFA)

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{K}$  une fonction continue sur  $I$ , et  $a \in I$ . Alors la fonction

$$F : I \rightarrow \mathbb{K} \\ x \mapsto \int_a^x f(t)dt$$

est l'unique primitive de  $f$  qui s'annule en  $a$ .

La fonction  $F$  est donc l'unique fonction (dérivable) qui vérifie  $F' = f$  et  $F(a) = 0$ .

**Exemple.** La fonction  $x \mapsto \frac{1}{x}$  est continue sur l'intervalle  $I = \mathbb{R}_+^*$ . En posant  $a = 1$ , on peut définir pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$

$$F : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

Cette fonction  $F$  est précisément la fonction  $\ln$ . La fonction  $\ln$  est par définition l'unique primitive de  $x \mapsto \frac{1}{x}$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  qui s'annule en 1.

### 2.3 Un premier corollaire du TFA

Le TFA permet de faire le lien entre les primitives et le calcul d'intégrale (i.e. l'aire sous la courbe). On peut en déduire de nombreuses conséquences !

**Notation.** Dans la suite, pour toute fonction  $F$  définie en  $a$  et  $b$ , on note

$$[F(t)]_a^b = F(b) - F(a) \quad \text{ou encore} \quad [F]_a^b = F(b) - F(a)$$

#### Corollaire 8.6

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{K}$  une fonction continue sur  $I$ , et  $F$  une primitive *quelconque* de  $f$  sur  $I$ . Alors

$$\forall a, b \in I \quad \int_a^b f(t) dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a)$$

*Preuve du corollaire.*

□

**Remarque.** Le nombre  $\int_a^b f(t) dt = [F(x)]_a^b$  ne dépend pas de la primitive  $F$  qu'on choisit : si  $G$  est une autre primitive de  $f$ , alors  $[G(x)]_a^b = [F(x)]_a^b$ , puisque  $G$  et  $F$  sont égales à constante près.

## 2.4 Remarques sur le TFA et son premier corollaire

Le TFA et le Corollaire 8.6 mettent en évidence le lien très fort entre primitives et intégrales :

- **(Intégrale / aire  $\rightarrow$  Primitive)** Si pour tout  $x \in I$ , on sait calculer l'aire  $\int_a^x f(t)dt$ , alors par le théorème fondamental, on connaît une primitive  $F$  de  $f$  sur  $I$ . Ainsi, toutes les primitives de  $f$  sur  $I$  sont les fonctions

$$x \mapsto \int_a^x f(t)dt + C \quad \text{avec } C \in \mathbb{K}$$

- **(Primitive  $\rightarrow$  Intégrale / aire)** Si on connaît une primitive de  $f$  sur  $I$ , le Corollaire 8.6 permet de calculer  $\int_a^b f(t)dt$ .

Outre ces deux aspects, le théorème fondamental a aussi une utilité plus théorique :

### Corollaire 8.7

Toute fonction continue sur  $I$  admet des primitives sur  $I$ .  
En outre, pour tout  $a \in I$ , il y a une primitive et une seule qui s'annule en  $a$ .

## 2.5 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

### Définition 8.8 – Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

On dit qu'une fonction  $f : I \rightarrow \mathbb{K}$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  si  $f$  est dérivable (sur  $I$ ) **ET** si sa dérivée  $f'$  est continue (sur  $I$ ).

Une fonction dérivable n'est pas toujours de classe  $\mathcal{C}^1$ , comme le montre l'exemple suivant (vu au TD 6).

**Exemple.** Soit  $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ . Montrer que  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  mais que  $f'$  n'est pas continue en 0.

Voici une réécriture du Corollaire 8.6 qui sert également en pratique :

### Corollaire 8.9

Soit  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ . Alors

$$\forall a, b \in I \quad f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t)dt$$

*Démonstration.* Comme  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ , la fonction  $f'$  est continue sur  $I$ . De plus  $f$  est clairement une primitive de  $f'$  sur  $I$ . On vérifie donc les hypothèses du Corollaire 8.6 pour la fonction  $f'$ , ce qui donne le résultat.  $\square$

### 3 Calcul pratique d'intégrales

#### 3.1 Reconnaître une primitive

Si on connaît une primitive de la fonction à intégrer, alors le corollaire 8.6 du TFA permet de conclure. *Dans les exercices, on peut appliquer directement la formule  $\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$  sans rappeler l'hypothèse que  $f$  est continue.*

**Remarque.** Un formulaire sur les primitives usuelles est disponible sur le site, formulaire qu'il est crucial de connaître pour trouver des primitives.

**Exemple.** Calculer  $\int_1^4 \frac{1}{x\sqrt{x}} dx$ .

**Exemple.** Soit  $k \in \mathbb{Z}$ . Calculer  $\int_0^\pi \cos(kt) dt$ .

**Remarque.** Si on connaît (par exemple) la primitive de  $\sqrt{x}$ , alors on sait trouver les primitives de  $\sqrt{ax+b}$  avec  $a$  et  $b$  deux réels. Il faudra donc, lorsque c'est possible, employer des réécritures pour essayer de se ramener à une telle situation, quitte à forcer l'apparition d'un  $ax+b$ .

**Exemple.** Calculer  $\int_0^{\sqrt{6}} \frac{1}{x^2+2} dx$ .

### 3.2 Propriétés de l'intégrale

On rappelle quelques propriétés générales de l'intégrale.

#### Théorème 8.10

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions continues sur  $I$  et à valeurs dans  $\mathbb{K}$ . Pour tous  $a, b \in I$ , on a les propriétés suivantes :

1. **Linéarité de l'intégrale** : pour tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ ,

$$\int_a^b (\lambda f(t) + \mu g(t)) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt + \mu \int_a^b g(t) dt$$

2. **Relation de Chasles** : soit  $c \in I$ . On a :

$$\int_a^c f(t) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_b^c f(t) dt$$

3. **Positivité** (avec  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ) : si  $a \leq b$  et  $f \geq 0$  sur  $[a, b]$ , alors

$$\int_a^b f(t) dt \geq 0$$

4. **Croissance** (avec  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ) : si  $a \leq b$  et  $f \leq g$  sur  $[a, b]$ , alors

$$\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt$$

*Démonstration.* En passant par une primitive. Par exemple, pour Chasles, on introduit une primitive  $F$  de  $f$  sur  $I$ . Alors :

$$\int_a^c f(t) dt = F(c) - F(a) = F(c) - F(b) + F(b) - F(a) = \int_b^c f(t) dt + \int_a^b f(t) dt$$

□

**Remarque** (Linéarité du crochet). L'intégrale est donc linéaire, et il en va de même du "crochet" d'intégration :

$$[\lambda f(x) + \mu g(x)]_a^b = \lambda [f(x)]_a^b + \mu [g(x)]_a^b$$

### 3.3 Intégration par parties

#### Théorème 8.11 – IPP

Soit  $u$  et  $v$  deux fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ , et  $a, b \in I$ . Alors

$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$$

*Démonstration.* Comme  $u$  et  $v$  sont dérivables, leur produit  $uv$  l'est aussi et on a

$$(uv)' = u'v + v'u$$

De plus, comme  $u$  et  $v$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$ , la fonction  $u'v + v'u$  est continue sur  $[a, b]$  par produit et somme de fonctions continues. On peut donc intégrer  $u'v + v'u$  et donc  $(uv)'$ . (En outre, deux fonctions égales ont la même intégrale sur  $[a, b]$ ). Ainsi :

$$\begin{aligned} \int_a^b (uv)' &= \int_a^b (u'v + v'u) \\ \implies [uv]_a^b &= \int_a^b u'v + \int_a^b v'u \end{aligned}$$

D'où le résultat. □

Dans le programme, il est explicitement mentionné que *pour appliquer l'IPP, on ne demande pas de rappeler les hypothèses que  $u$  et  $v$  soient de classe  $\mathcal{C}^1$* . Mais il est toujours bon de le vérifier mentalement.

**Remarque.** L'IPP permet de remplacer une fonction par sa dérivée. L'IPP est particulièrement adaptée pour les fonctions "compliquées" dont la dérivée est plus simple, comme les fonctions  $\ln$ ,  $\arccos$ ,  $\arcsin$ ,  $\arctan$ , etc.

**Exemple.** Calculer  $\int_1^e \ln(x) dx$ .

### 3.4 Changement de variables $u = \varphi(x)$ dans $\int_a^b f(x)dx$

Dans cette section, pour tous  $a, b \in \mathbb{R}$  on définit la notation (non officielle) suivante :

$$\overline{[a, b]} = [a, b] \cup [b, a] = \begin{cases} [a, b] & \text{si } a \leq b \\ [b, a] & \text{si } b \leq a \end{cases}$$

Autrement dit,  $\overline{[a, b]}$  désigne l'intervalle fermé de  $\mathbb{R}$  ayant pour bornes  $a$  et  $b$ .

#### Théorème 8.12

Soit  $g : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue, et  $\varphi : \overline{[a, b]} \rightarrow I$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ . Alors :

$$\int_a^b g(\varphi(x)) \times \varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} g(u) du$$

*Démonstration.* Soit  $G$  une primitive de  $g$  sur  $I$ . Alors  $(G \circ \varphi)' = (g \circ \varphi) \times \varphi'$ . (De plus, la dérivée de  $G \circ \varphi$  est continue sur  $\overline{[a, b]}$  car  $g \circ \varphi$  et  $\varphi'$  le sont). Ainsi :

$$\begin{aligned} \int_a^b (g \circ \varphi)(x) \varphi'(x) dx &= \int_a^b (G \circ \varphi)'(x) dx & \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} g(u) du &= [G(u)]_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} \\ &= [(G \circ \varphi)(x)]_a^b & &= G(\varphi(b)) - G(\varphi(a)) \\ &= G(\varphi(b)) - G(\varphi(a)) \end{aligned}$$

On obtient donc l'égalité voulue. □

En pratique, il n'est guère utile de retenir l'énoncé du Théorème ci-dessus, mais il est **primordial de savoir l'appliquer**. Dans cette section, on commence par le cas où l'on définit la “nouvelle” variable  $u$  en fonction de “l'ancienne” variable  $x$  qui existe déjà dans l'intégrale.

#### Méthode – Changement de variable $u = \varphi(x)$

On dispose d'une intégrale  $\int_a^b f(x)dx$ . Pour faire le changement de variable  $u = \varphi(x)$  :

1. On écrit  $\begin{cases} u = \varphi(x) \\ du = \varphi'(x)dx \end{cases}$ .

- Si  $\varphi$  est continue et strictement monotone sur  $\overline{[a, b]}$ , on peut **renverser** la relation en  $\begin{cases} x = \psi(u) \\ dx = \psi'(u)du \end{cases}$  (avec  $\psi = \varphi^{-1}$ )

2. On transforme le “ $dx$ ” en “ $du$ ”, grâce à une des relations ci-dessus.

3. On transforme tous les “ $x$ ” de  $f(x)$  en “ $u$ ”, grâce aux relations ci-dessus.

4. On change les bornes :  $\int_{x=a}^{x=b}$  devient  $\int_{u=\varphi(a)}^{u=\varphi(b)}$

**Exemple.** Calculer  $\int_1^e (\ln x)^2 dx$  avec le changement de variables  $u = \ln x$  (résolution avec un renversement)

**Remarque.** Dans l'exemple ci-dessus, on a renversé les relations pour faire les transformations de l'intégrale. Ce n'est pas une obligation ! Si on arrive à réécrire  $f(x)$  en  $g(\varphi(x))\varphi'(x)$ , alors il n'est pas nécessaire de faire de renversement :

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b g(\varphi(x)) \times \varphi'(x) dx \\ &= \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} g(u) du \quad \begin{cases} u = \varphi(x) \\ du = \varphi'(x) dx \end{cases} \end{aligned}$$

Si aucun renversement n'est nécessaire, alors il n'est pas nécessaire que  $\varphi$  soit continue et strictement monotone sur  $I_{a,b}$  : d'ailleurs ce n'est pas une hypothèse du Théorème 8.12.

**Exemple.** Calculer l'intégrale  $\mathcal{I} = \int_0^1 \frac{1}{\operatorname{ch} x} dx$ . (résolution sans renversement)

À ce stade, l'idée naturelle est de faire le changement de variable  $\begin{cases} u = e^x \\ du = e^x dx \end{cases}$  pour "simplifier" tous les  $e^x$ .

Cependant, on ne trouve pas de terme " $e^x dx$ " qui pourrait se transformer en " $du$ ". On pourrait croire qu'on est forcé de faire un renversement, mais on peut être plus malin en forçant l'apparition de " $e^x dx$ " avec la technique du " $\frac{1}{1}$ " !

### 3.5 Changement de variables $x = \varphi(t)$ dans $\int_a^b f(x)dx$

Méthode – **Changement de variable**  $x = \varphi(t)$

On dispose d'une intégrale  $\int_a^b f(x)dx$ . Pour faire le changement de variable  $x = \varphi(t)$  :

1. On écrit  $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ dx = \varphi'(t)dt \end{cases}$ .
2. On transforme le “ $dx$ ” en “ $\varphi'(t)dt$ ”.
3. On transforme tous les “ $x$ ” de  $f(x)$  en “ $\varphi(t)$ ”.
4. On identifie  $t_a$  et  $t_b$  tels que  $\varphi(t_a) = a$ ,  $\varphi(t_b) = b$  et  $\varphi(\overline{[t_a, t_b]}) = \overline{[a, b]}$ . Enfin, on change les bornes :

$$\int_{x=a}^{x=b} \text{ devient } \int_{t=t_a}^{t=t_b}$$

**Exemple.** Calculer l'intégrale  $\mathcal{I} = \int_0^1 \sqrt{1-x^2}dx$  avec le changement de variable  $x = \sin t$ .

**Remarque.** Dans l'exemple ci-dessus, on aurait pu choisir d'autres valeurs pour  $t_a$  et  $t_b$ . On aurait pu prendre :

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} t_a = \pi \\ t_b = \frac{\pi}{2} \end{array} \right. \quad \text{on aurait alors obtenu} \quad \mathcal{I} &= \int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos^2(t)} \cos(t) dt \\ &= - \int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t) dt \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^2(t) dt \end{aligned}$$

ce qui aurait mené au même résultat.

### 3.6 Résultats de parité et de périodicité

#### Théorème 8.13

Soit  $a \geq 0$  et  $f$  une fonction continue.

- Si  $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$  est impaire, alors  $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ .
- Si  $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$  est paire, alors  $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$ .
- Si  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est  $T$ -périodique, alors pour tout  $b \in \mathbb{R}$ , on a  $\int_b^{b+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$ .

*Démonstration.* On ne fait la preuve que du résultat pour  $f$  impaire.

□

## 4 Primitives et intégrales de fonctions complexes

### 4.1 Définition

#### Définition 8.14

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$  et  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ . Si  $f$  est continue, alors  $\operatorname{Re} f$  et  $\operatorname{Im} f$  le sont aussi et on définit l'intégrale de  $f$  par :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \operatorname{Re}(f(t)) dt + i \int_a^b \operatorname{Im}(f(t)) dt$$

En d'autres termes,

$$\operatorname{Re} \left( \int_a^b f(t) dt \right) = \int_a^b \operatorname{Re}(f(t)) dt \quad \text{et} \quad \operatorname{Im} \left( \int_a^b f(t) dt \right) = \int_a^b \operatorname{Im}(f(t)) dt$$

Ainsi, tout se passe comme si le nombre  $i$  est une constante.

**Exemple.** Calculer l'intégrale  $\mathcal{I} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (e^{i2x} + ix^2) dx$ .

Ceci permet de donner un sens à toutes les notions vues plus haut lorsque  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ .

## 4.2 Le passage par les complexes

Méthode – **Intégrales des fonctions**  $e^{\alpha x} \cos(\beta x), e^{\alpha x} \sin(\beta x)$

Soit  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  avec  $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$ . Pour calculer  $\int_a^b e^{\alpha x} \cos(\beta x)$ , on écrit

$$\begin{aligned} \int_a^b e^{\alpha x} \cos(\beta x) dx &= \int_a^b e^{\alpha x} \operatorname{Re} \left( e^{i\beta x} \right) dx \\ &= \operatorname{Re} \left( \int_a^b e^{\alpha x + i\beta x} dx \right) \end{aligned}$$

et on connaît une primitive de  $e^{(\alpha + i\beta)x}$ . Idem pour  $\int_a^b e^{\alpha x} \sin(\beta x) dx$ .

**Exemple.** Calculer l'intégrale  $\mathcal{I} = \int_0^\pi e^{-x} \sin(4x) dx$ .

## 5 Intégrales de fonctions rationnelles

Dans cette section, on considère un polynôme de degré 2  $P(x) = ax^2 + bx + c$  avec  $a, b, c \in \mathbb{R}$  et  $a \neq 0$ . On cherche à calculer

$$\int_A^B \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx \quad \left( = \int_A^B \frac{1}{P} \right)$$

avec  $A < B$  deux réels. On suppose que  $P$  ne s'annule pas sur  $[A, B]$ , donc la fonction  $\frac{1}{P}$  sera continue sur  $[A, B]$ , de sorte que l'intégrale ci-dessus a un sens. Il y a en tout trois cas possibles, selon que  $P$  admette zéro, un ou deux racines dans  $\mathbb{R}$ .

Méthode – **Intégrale de  $\frac{1}{ax^2 + bx + c}$  (racine double)**

1. Si  $P$  admet une racine double  $r \in \mathbb{R}$ , on a donc  $P(x) = a(x - r)^2$ . Alors, on peut trouver une primitive de  $\frac{1}{P}$  directement :

$$\int_A^B \frac{1}{a(x - r)^2} dx = \dots\dots\dots$$

**Exemple.** Calculer l'intégrale  $\mathcal{I}_1 = \int_0^1 \frac{1}{4x^2 + 4x + 1} dx$ .

Méthode – **Intégrale de  $\frac{1}{ax^2+bx+c}$  (deux racines réelles)**

2. Si  $P$  admet deux racines distinctes  $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ , on a donc  $P(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$ . Alors, on trouve des coefficients  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$  tels que

$$\forall x \in [A, B] \quad \frac{1}{(x - r_1)(x - r_2)} = \frac{c_1}{x - r_1} + \frac{c_2}{x - r_2}$$

et on intègre ensuite chaque terme directement puisque  $\int_A^B \frac{c_i}{x - r_i} dx = \dots\dots\dots$

**Exemple.** Calculer l'intégrale  $\mathcal{I}_2 = \int_{-1}^0 \frac{1}{x^2 + x - 2} dx$ .

Méthode – **Intégrale de  $\frac{1}{ax^2+bx+c}$  (pas de racine réelle)**

3. Si  $P$  n'admet aucune racine réelle, on le met sous la forme canonique  $P(x) = a((x + \beta)^2 + \gamma^2)$  avec  $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$  et  $\gamma \neq 0$ . Ensuite, on fait une réécriture pour faire apparaître du  $\frac{1}{X^2 + 1}$  dans l'intégrale avec une expression  $X$  qui dépend de  $x$  :

**Exemple.** Calculer l'intégrale  $\mathcal{I}_3 = \int_0^1 \frac{1}{x^2 + x + 1} dx$ .

## 6 Calcul de primitives par un calcul d'intégrale

Par le TFA, on sait que la fonction  $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$  est (l'unique) primitive de  $f$  qui s'annule en  $a$ .

**Notation.** Il arrive qu'on note

$$\int_a^x f(t)dt \quad \text{ou} \quad \int^x f$$

pour désigner  $F(x)$ , avec  $F$  une primitive quelconque de  $f$ . Toutefois, cette expression n'est définie qu'à constante près, et donc on n'utilisera cette notation que lorsqu'on cherchera une primitive de  $f$ .

En quelque sorte, c'est comme si on ne précisait pas qui est le  $a$  qu'on choisit pendant le calcul de  $\int_a^x f(t)dt$ .

**Exemple.** On peut écrire

$$\int^x \cos(t)dt = [\sin t]^x = \sin x$$

pour signifier que  $x \mapsto \sin x$  est une primitive de  $\cos$ . Mais on pourrait aussi écrire  $\int^x \cos(t)dt = \sin x + 3 \dots$

Sont valides avec cette notation : la linéarité, l'IPP et bien sûr le passage au crochet lorsqu'on a trouvé une primitive.

**Exemple.** Calculer une primitive sur  $\mathbb{R}$  de  $f : x \mapsto \frac{1}{x^2 + 3}$ .

## 7 Règles de Bioche – intégrales $\int_a^b R(\cos x, \sin x) dx$

On suppose qu'on souhaite calculer une intégrale de la forme  $\int_a^b R(\cos x, \sin x) dx$ , où  $R$  est une fonction rationnelle à deux variables, par exemple :

$$\int_a^b \frac{\cos^2 x - 6 \cos(x) \sin(x) + 3}{\sin^3 x (1 + \cos^2 x)} dx = \int_a^b R(\cos x, \sin x) dx \quad \text{avec } R(x, y) = \frac{x^2 - 6xy + 3}{y^3(1 + x^2)}$$

$$\int_a^b [2 \cos^2(x) - 4 \sin^5(x) \cos(x) + \sqrt{3}] dx = \int_a^b R(\cos x, \sin x) dx \quad \text{avec } R(x, y) = 2x^2 - 4y^5x + \sqrt{3}$$

Les règles de Bioche permettent de trouver un changement de variables qui, **s'il est licite**, permettra *parfois* de calculer l'intégrale. On regarde pour cela l'expression

$$w(x) = R(\cos x, \sin x) \times \boxed{dx}$$

- Si  $w(x) = w(-x)$ , alors on peut poser  $u = \cos x$ . avec la règle  $d(-x) = -dx$
- Si  $w(x) = w(\pi - x)$ , alors on peut poser  $u = \sin x$ . avec la règle  $d(\pi - x) = -dx$
- Si  $w(x) = w(\pi + x)$ , alors on peut poser  $u = \tan x$ . avec la règle  $d(\pi + x) = dx$
- Dans tous les cas, on peut poser  $u = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$  et utiliser les formules d'angle moitié. Mais les calculs peuvent être plus complexes qu'avec les trois autres méthodes ci-dessus.

## 8 Méthodes pour les exercices

Le calcul d'intégrales peut faire intervenir de nombreuses techniques différentes, qui peuvent être combinées.

- **La relation de Chasles** est utile pour traiter des fonctions dont l'expression nécessite de distinguer deux cas ou plus.

$$\int_{-1}^1 |x| dx = \int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^1 x dx$$

- **La parité ou la périodicité** mènent parfois à des raccourcis salvateurs.

$$\int_{-7\pi}^{7\pi} \arctan x dx = 0$$

- **Reconnaitre une primitive** nécessite de la pratique. Notamment, il faut pouvoir reconnaître des fonctions de la forme  $u'u^\alpha$  (avec  $\alpha \in \mathbb{R}$ ) et les intégrer. On peut écrire une primitive “approchée” au brouillon (qui a la bonne tête à constante près) et se ramener à la forme exacte en tâtonnant.

$$\forall n \in \llbracket 2, +\infty \rrbracket \quad \int_a^b \frac{x}{(x^2 + 1)^n} dx = \dots$$

- **L'intégration par parties** est utile lorsqu'une fonction est “compliquée” mais que sa dérivée est simple. Si on ne dispose que d'une fonction, on peut considérer que la seconde est  $x \mapsto 1$ , cf section 3.3.

Parfois, il faut intégrer par parties plusieurs fois d'affilée. Cela permet de traiter des intégrales du type

$$\int_a^b x^n e^x dx \quad \int_a^b x^n \cos x dx \quad \int_a^b x^n \sin x \quad \dots$$

- **Le changement de variables** est très efficace... à condition de faire la bonne transformation. Il existe différentes techniques selon la forme de l'intégrale à calculer.

Enfin, d'autres petites techniques permettent de simplifier des calculs. On peut mentionner les stratégies “ $+1 - 1$ ” ou “ $\frac{1}{1}$ ”, l'utilisation de formules de trigonométrie, le passage aux complexes par les formules d'Euler...